



CHUCaen

Fiche conseil



Sivextro®

Tédizolide
200mg comprimé

INDICATION

- Ce médicament est un antibiotique indiqué dans le **traitement des infections bactériennes aiguës** de la peau et des tissus mous chez les adultes et les adolescents à partir de 12 ans.
- Il est prescrit par **un médecin hospitalier**
- Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières sur présentation de votre ordonnance, de votre carte vitale et de votre carte mutuelle
- Comprimé jaune ovale de 200mg portant l'inscription « TZD » gravé sur une face et « 200 » sur l'autre

MODALITES D'ADMINISTRATION : VOIE ORALE

- **Quand ?** 1 comprimé par jour à heure fixe, pendant ou en dehors des repas.
- **Comment ?** Avalez les comprimés, avec de l'eau, chaque jour au même moment de la journée. Ne pas mâcher, ni couper, ni écraser, ni dissoudre.

En cas d'oubli : celle-ci doit être prise le plus tôt possible à tout moment jusqu'à 8 heures avant la prochaine dose prévue. Si le délai jusqu'à la prochaine dose est de moins de 8 heures, attendre le moment de la prochaine dose prévue. Il ne faut pas doubler la dose pour compenser une dose oubliée.

En cas de vomissement : ne prenez pas de nouvelle dose. Poursuivez le traitement à l'heure habituelle, sans la doubler.

EFFETS INDESIRABLES

Baisse des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes	Pensez à faire pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin
Troubles digestifs : nausées, vomissement, diarrhée.	Pensez à bien vous hydrater (2L d'eau par jour) ; buvez plutôt entre les repas. En cas de nausées/vomissements, fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers et mangez lentement. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Evitez de rester l'estomac vide, cela accentue les nausées.
Maux de tête, fatigue, vertiges	Privilégiez une alimentation saine et à horaires réguliers. Limitez l'usage de psychostimulants tels que café, tabac et alcool. Respectez des temps de repos dans la journée en conservant une activité même modérée.
Prurit généralisé	Utilisez un gel ou un pain dermatologique sans savon. Evitez l'eau chaude. Séchez par tamponnement. Appliquez un agent hydratant (crème ou lait). Appliquez des compresses froides sur les zones concernées (ne pas appliquer de lotions alcoolisées). Privilégiez les vêtements en coton amples et légers.
Troubles visuels	Consultez rapidement votre médecin si vous présentez une baisse de la vision ou une vision trouble.

Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Vision trouble
- Problèmes de peau, œdème du visage autour du visage et du cou, sifflement et/ou difficulté à respirer
- Diarrhée aiguë, contenant du sang et/ou du mucus
- Nausées ou vomissements à répétition, douleur abdominale
- Respiration rapide
- Convulsions
- Fièvre
- Tout effet indésirable persistant ou s'aggravant



INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

La prise concomitante de nouveaux médicaments non contrôlés par un médecin ou un pharmacien peut entraîner une diminution de l'efficacité de votre traitement. : pensez à prévenir votre médecin ou pharmacien de la prise d'autres médicaments.

- Traitement contre-indiqué pendant la grossesse
- Interrompez l'allaitement durant le traitement