



FERRIPROX[®] cps

► déféripnone

À quoi sert ce médicament ?

- Médicament contenant la substance active déféripnone.
- Il est destiné à traiter les surcharges en fer.

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières sur présentation de votre ordonnance, de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle.

- Comprimé, dosé à **500 mg** ou **1000 mg**, bisécable blanc à blanc cassé, en forme de gélule, pelliculé, porte sur une face les inscriptions « APO » et « 500 » ou « 1000 »



► À conserver à une température ne dépassant pas 30°C, à l'abri de l'humidité.



► **Ne jetez pas** les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien

Comment prendre ce médicament ?

Quand ?h.....,h.....,h..... (1 ou 3 prises / jour)
Comment ?	Avalez avec un peu d'eau. Comprimés sécables.

► Que faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

- **En cas d'oubli ou de vomissement** : prendre la dose oubliée dès l'oubli constaté. Prendre la dose suivante à l'heure habituelle. Ne pas doubler la dose pour compenser une dose oubliée.

Information

- Ce médicament provoque une coloration des urines rougeâtre/brune.

Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation





Des interactions avec d'autres médicaments peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables, Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription.



- Traitement non recommandé pendant la grossesse
- L'allaitement n'est pas recommandé durant le traitement

Quels effets indésirables peuvent survenir avec FERRIPROX® ?

Comme tous les médicaments, FERRIPROX® peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables	Prévention
 <p>Affections gastro-intestinales</p>	Les effets gastro-intestinaux sont plus fréquents en début de traitement et, chez la plupart des patients, se dissipent en quelques semaines sans qu'une suspension du traitement ne soit nécessaire. Chez certains patients, il pourrait se révéler bénéfique de réduire la dose de déféripone, puis de l'augmenter à nouveau pour retrouver la dose précédente.
 <p>Baisse des globules blancs</p>	Des examens biologiques doivent être pratiqués chaque semaine pendant la première année de traitement. Prévenir votre médecin : si vous présentez des symptômes d'infection comme de la fièvre, des maux de gorge ou des symptômes semblables à ceux de la grippe.



Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Contactez rapidement votre médecin en cas de d'effet indésirable persistant ou s'aggravant



Une carte de rappel patient est jointe à la boîte. Détachez-la, complétez-la, lisez-la soigneusement et portez-la toujours sur vous.

Fiche remise le :

