

METHOTREXATE 2mg/mL sol buv



FICHE
CONSEIL

Patient

Qu'est-ce que METHOTREXATE 2mg/ml, solution buvable ?

- Agent antinéoplasique et immunomodulateur utilisé dans certaines indications oncologiques (leucémie lymphocytaire aiguë, tumeurs trophoblastiques malignes, ...) et maladies auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde active sévère, arthrite juvénile idiopathique sévère, ...).
- Médicament nécessitant une **autorisation d'accès compassionnel** (AAC).
- Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières
- Solution orale jaune clair.
- Ne pas conserver à une température > à 25°C. Ne pas réfrigérer. Conserver dans le carton d'origine à l'abri de la lumière. Après ouverture, le produit peut être conservé pendant maximum 3 mois.



► Ne jetez pas les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien.

Comment prendre ce médicament ?

Quand ?

Le
(jour de la semaine)
àh.....

1 prise unique, à heure fixe, une seule fois par semaine
au cours ou en dehors d'un repas

► La boîte de ce médicament contient une seringue de dosage de 10mL avec adaptateur.




Figure 1. Ouvrez le flacon : appuyez sur le bouchon et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Figure 2. Insérez l'adaptateur de seringue dans le goulot du flacon

Figure 3. Prenez la seringue et introduisez-la dans l'ouverture de l'adaptateur

Figure 4. Retournez le flacon

Figure 4A. Remplissez la seringue d'une petite quantité de solution en tirant le piston vers le bas

Figure 4B. Poussez le piston vers le haut afin d'éliminer toute bulle éventuelle

Figure 4C. Tirez le piston vers le bas jusqu'à la graduation correspondant à la quantité en millilitres (ml) prescrite par votre médecin. Le bord supérieur plat du piston doit être aligné sur le repère de la graduation que vous mesurez

Figure 5A. Tournez le flacon dans le bon sens

Figure 5B. Retirez la seringue de l'adaptateur et administrez le contenu de la seringue dans la bouche en poussant le piston jusqu'au fond de la seringue et assurez-vous que tout le médicament soit bien avalé. Fermez le flacon avec le bouchon à vis en plastique en laissant l'adaptateur de seringue dans le flacon.

Figure 6. Lavez la seringue avec de l'eau chaude savonneuse et rincez-la bien. Laissez la seringue sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau pour le dosage.

Que faire en cas d'oubli, vomissement ?

- **En cas d'oubli < 24h :** prenez le traitement dès que possible. La dose suivante sera prise le jour habituel de la semaine suivante (ne pas prendre de dose supplémentaire/ne pas doubler la prise suivante).
- **En cas d'oubli d'une prise > 24h :** contactez le prescripteur afin d'adapter la conduite à tenir : prise dès que possible et décalage du jour de prise de sorte à respecter un intervalle de 7 jours ou bien prise reportée au jour habituel la semaine suivante.
- **En cas de vomissement,** ne prenez pas de nouvelle dose et **ne doublez pas la prise suivante.**

Précautions particulières

- Les parents et les soignants **doivent porter des gants jetables** lors de la manipulation du méthotrexate
- Une fois la dose avalée, il faut boire un verre d'eau pour éliminer tout résidu de méthotrexate de la cavité buccale.
- Les **mains doivent être bien lavées avec du savon et de l'eau chaude** immédiatement après utilisation.
-  **Les femmes enceintes, qui prévoient de l'être ou qui allaitent ne doivent pas manipuler le méthotrexate.**
- Les femmes traitées doivent utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement **et jusqu'à 6 mois après la dernière prise.**
- Les hommes traités doivent utiliser un préservatif pendant toute la durée du traitement **et jusqu'à 6 mois après la dernière prise.**

Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation

Des interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables, Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription.

► **Ne pas prendre METHOTREXATE 2mg/mL avec des laitages (diminution de son efficacité).**

Quels effets indésirables peuvent survenir avec le METHOTREXATE 2mg/mL ?

Troubles digestifs (nausées, vomissements, anorexie, inconfort abdominal), inflammation de la bouche, baisse des globules blancs et des plaquettes, risque d'infection, etc.

 Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

 Pensez à faire pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin.

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Signes d'infection (fièvre, maux de gorge, fatigue...)
- Saignements, des contusions, du sang dans les urines ou dans les selles...
- Toux sèche, difficultés à respirer, fièvre
- Réactions cutanées
- Vomissements, diarrhée, déshydratation
- Tout effet indésirable persistant ou s'aggravant



Contacts utiles :

Fiche remise le :

