



# LECIGIMON® GEL INTEST

► Lévodopa, Entacapone, Carbidopa

## À quoi sert ce médicament ?

- LECIGIMON est utilisé pour le traitement de la **maladie de Parkinson**. Il est utilisé lorsque la maladie est **au stade avancé** et lorsque les **médicaments pris par voie orale n'ont plus un effet suffisant**.
- LECIGIMON est un **gel administré de façon continue** au moyen d'une **pompe** et d'une **sonde directement** dans votre **intestin grêle**.
- Il contient 3 substances actives : lévodopa, carbidopa et entacapone.

**Médicament disponible en pharmacie hospitalière sur présentation de votre ordonnance, de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle.**

**Pensez à ramener la glacière qui a été fournie par le prestataire**



- **Avant ouverture de la cartouche** : conservation au réfrigérateur, **entre 2 et 8°C**, au niveau des étagères ajourées de préférence (ne pas stocker au niveau des parois, de la porte, du bac à légumes ou dans le congélateur). Enlever la cartouche de la pochette ou du sac isotherme avant de le mettre au réfrigérateur.
- **Après ouverture de la cartouche** : utiliser immédiatement. La cartouche peut être utilisée pendant 24h maximum, une fois sortie du réfrigérateur.



- Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus.

## Comment est administré LECIGIMON® ?

- LECIGIMON est un gel qui est administré au moyen d'une **pompe portable** (Crono LECIG) et d'une **sonde** directement **dans la partie supérieure** de votre **intestin**.
- Le gel est contenu dans une **cartouche connectée à la pompe**. La **pompe** est **connectée** à une **sonde placée à l'intérieur de votre intestin à travers la paroi abdominale** lors d'une intervention chirurgicale.
- Avant l'insertion de la sonde dans votre intestin grêle, le médecin pourra vouloir vérifier si le traitement par LECIGIMON fonctionne chez vous. Dans ce cas, le gel sera administré dans votre intestin grêle au moyen d'une sonde (un tube) en passant par votre nez, votre gorge et votre estomac.
- Votre **médecin détermine** vos **doses individuellement sur la base** de votre **traitement antérieur**. Il pourra être nécessaire d'ajuster la dose durant les premières semaines de traitement.
- Une **dose importante** est administrée **le matin**, au début du traitement. Cela permet d'obtenir rapidement la bonne quantité de médicament dans votre sang. Après l'administration de cette dose, une **dose d'entretien continue** est administrée **durant la journée** (généralement **pendant 16 heures** environ). Si nécessaire, votre médecin pourra décider de vous administrer LECIGIMON jusqu'à 24 heures par jour.
- **Une fois la cartouche installée, la pompe d'administration peut être portée près du corps** pendant une **durée allant jusqu'à 16 heures**. Pour le **traitement durant la nuit, la pompe ne doit pas être portée près du corps** mais peut être posée, par exemple, sur la table de nuit.
- En cas d'interruption du traitement pendant la nuit, vous pourrez continuer à utiliser la cartouche ouverte le jour suivant, mais **sans dépasser une durée maximale de 24 heures à compter de la première ouverture**. Ne dissociez pas la cartouche de la pompe avant d'avoir terminé de l'utiliser (soit au bout de 24 heures après l'ouverture, soit lorsqu'elle est vide, selon ce qui survient en premier).

## Quelques conseils







Des interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables, Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription.



- Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
- LECIGIMON n'est pas recommandé pendant la grossesse et chez les femmes en âge de procréer n'utilisant pas de contraception sauf si le médecin détermine que les bénéfices pour la mère dépassent les risques éventuels pour le fœtus.

# Quels effets indésirables peuvent survenir avec LECIGIMON® ?

Comme tous les médicaments, LECIGIMON® peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables		Prévention
	Constipation, diarrhée, nausées	Surveillez votre poids et pensez à bien vous hydrater (1,5 à 2L d'eau/jour). <b>En cas de constipation</b> , privilégiez une alimentation riche en fibres (son, céréales, pain complet, légumes verts, fruits et fruits secs) et pratiquez une activité physique régulière. <b>En cas de diarrhée</b> , privilégiez une alimentation pauvre en fibres (féculents, carotte, banane...). Evitez certains aliments qui peuvent stimuler le transit intestinal (laitages, fruits-légumes crus, céréales, aliments gras, épices). <b>En cas de nausées</b> , fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers et mangez lentement. Evitez les aliments gras, frits et épicés, et ceux dont l'odeur peut déclencher les nausées. Evitez de rester l'estomac vide, cela accentue les nausées. Buvez plutôt entre les repas. Utilisez les médicaments antiémétiques qui vous ont été prescrits le cas échéant.
	Douleurs musculaires	Pensez à bien vous hydrater. Pratiquez une activité physique régulière et adaptée ; chauffez-vous au préalable.
	Sensations vertigineuses quand vous vous levez ou que vous changez de position	Evitez les levers trop rapides, évitez les stations debout prolongées immobiles, surélever de 15 cm la tête du lit, mettez des chaussettes ou bas de contention, buvez au moins 1,5 L d'eau par jour, marchez régulièrement sans forcer, évitez la prise d'alcool.
	Mal-être	Evitez l'isolement, maintenez le contact avec vos proches. Pratiquez une activité physique (30 min/jour, idéalement en extérieur), ayez une alimentation équilibrée et variée. En cas de baisse de morale, de sommeil perturbé, d'anxiété ou d'idées noires, demandez de l'aide auprès d'un professionnel de santé.



\* Les effets indésirables les plus fréquents

Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

## Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

**Contactez rapidement votre médecin en cas de d'effet indésirable persistant ou s'aggravant et si vous présentez l'un des symptômes suivants :**

- Démangeaisons, urticaire, gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, pouvant entraîner des difficultés pour respirer ou avaler. Chute de la pression artérielle
- Ensemble des symptômes associant : raideur musculaire, crampes, tremblements, sueurs, fièvre, pouls rapide, fluctuations sévères de la pression artérielle, comportement agressif, confusion, perte de conscience
- Douleurs musculaires, crampes musculaires ou faiblesse musculaire inexplicées
- Douleurs abdominales, nausées ou vomissements
- Infection avec des symptômes tels que de la fièvre et une altération sévère de l'état général ou de la fièvre avec des symptômes d'infection locale, tels que des maux de gorge, des douleurs dans la bouche ou des difficultés pour uriner
- Idées suicidaires ou tentatives de suicide



Fiche remise le :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_